

SpotMax

Pipeta Pulguicida | Garrapaticida

Antiparasitario externo contra pulgas y garrapatas
Repelente de moscas y mosquitos

Venta libre en locales
con asesoramiento veterinario

Contenido neto:

Para perros de 2 a 10 Kg de peso: 1,5 ml

Para perros de 11 a 20 Kg de peso: 3 ml

Para perros de 21 a 40 Kg de peso: 6 ml

Para perros de 41 a 60 Kg de peso: 9 ml

Uso Veterinario
Industria Argentina

Fórmula

Imidacloprid (1) 7,60 g, Permetrina (2) 35,70 g; Butóxido de Piperonilo: 1,00 g, Agentes de formulación c.s.p. 100 ml

(1) 1-[[6-Cloro-3-piridinil] metil] - 4,5-dihidro-N-nitro-1H-imidazol -2 -amina

(2) 2,2 - dimetil-3-(2,2-diclorovinil - ciclopropil - 1 - carboxilato de 3- fenoxibencilo.

Indicaciones

Antiparasitario externo contra pulgas y garrapatas en caninos.

Efectivo contra:

Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis y Rhipicephalus sanguineus

Administración y Dosis:

Uso Externo, aplicar el contenido total del envase a lo largo del cuello, entre la nuca y el comienzo de dorso, separando el pelo.



Contraindicaciones:

No aplicar en cachorros menores de 10 semanas de edad.

No administrar a hembras preñadas ni a animales pesando menos de 2 Kg

Precauciones y advertencias:

VENENO. Manipular con cuidado. No aspirar ni ingerir. Evitar el contacto con piel y mucosas. Lavarse con abundante agua y jabón después de su uso. En humanos puede causar irritación ocular, enjuagar con abundante agua, si la irritación persiste, llamar al médico. Evitar la contaminación de los alimentos. Evitar el uso excesivo en cada aplicación.

Síntomas de intoxicación en los animales:

Malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cólicos, diarreas, Pulso más lento. Dificultad respiratoria, Contracciones e incoordinación muscular, calambres. Temblores. En casos graves, depresión, insuficiencia hepática, edema de pulmón, estado de colapso y coma.

Antídoto: No hay antídoto específico, en caso necesario, aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación y Primeros auxilios en el hombre:

Malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cólicos, diarreas, Pulso más lento. Dificultad respiratoria, Contracciones e incoordinación muscular, calambres. Temblores. En casos graves, depresión, insuficiencia hepática, edema de pulmón, estado de colapso y coma.

Primeros Auxilios:

No hay antídoto específico.

Llamar al médico. En caso de ingestión, provocar el vómito con ayuda de una pluma o agua salada tibia en abundancia. Hacer reposar al paciente. En caso de lesiones en ojos, lavar con abundante agua. En caso de lesiones en piel, lavar con abundante agua y jabón.

Teléfonos del Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

ATENCIÓN: LEA EL ROTULO

INFLAMABLE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar entre 15° y 30°C.

Director Técnico: Dr. Federico Navarro

Médico Veterinario - M. N° 5933



Cert. N° 08-223

Elaborado en Establecimiento Habilitado N° 8626



VON FRANKEN S.A.I.C.

Gral. Lavalle 2247/49 - (1602) Florida - Pcia. de Bs. As. - Rep. Argentina

Tel. (54-11)4797-5544 (L. Rotativas) - Fax (54-11)4797-8257

E-mail: consultas@fatrovonfranken.com.ar - www.fatrovonfranken.com

Importado por: Uruguay: Fatro Fedagro S.R.L., Ruta 8 Km. 20 B. Gral. J. A. Lavalleja N° 10601, Tel.: 22202336. DT. Dr. Rodolfo Meerhoff. Reg. M.G.A.P. N° A-4836. Panamá: RF-5952-20. Ecuador: CARVALECUADOR, Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas, Quito. Tel. 593 999846942. Reg. N° 382-11587-AGROCALIDAD. Guatemala: MAGA N° AR296-43-02-2197. Nicaragua: Reg. N° 8555. Paraguay: COMVETSA. RUC 80094148-9. Nicasio Villalba 2165 casi Libertad, Fernando de la Mora Zona Norte, SENACSA N° 12461. DT. Dr. Rodrigo Dávalos Reg.1228. Honduras: Reg. HND IP-480. Perú: TOTALVET SAC, Calle Los Plateros 142 Urb. El Artesano, Ate-Lima. Reg. SENASA N° F:87.581.0187. Costa Rica: Reg. M.A.G. MV-7220.

10 x 13,8 cm